


Procedimientos urológicos urológicos de vanguardia para una recuperación rápida y segura

Precisión quirúrgica, tecnología
mínimamente invasiva y
acompañamiento humano continuo.

Dra. Paola Alejandra López Hernández
Especialista en Urología



Libерación de Frenillo: Corrección rápida para una función sexual sin dolor

 **Duración:** 20 minutos.

 **Anestesia:** Local.

 **Recuperación:** 1 a 2 semanas.

Contexto Clínico



Definición: Procedimiento (frenuloplastia) para alargar o liberar el frenillo del pene cuando es demasiado corto o restrictivo.




Indicado para: Pacientes con frenillo breve que limita la retracción del prepucio.



Síntomas asociados: Dolor agudo durante la erección o la actividad sexual, tensión extrema, desgarros o sangrado menor.

Proceso Quirúrgico



1. Aplicación de anestesia local.
2. Incisión transversal milimétrica para liberar tensión.
3. Reposicionamiento del tejido.
4. Sutura longitudinal para ganar longitud y elasticidad.

Resultados y Cuidados



Beneficios: Elimina la tensión dolorosa, previene desgarros futuros y restaura la comodidad funcional.



Cuidados: Higiene diaria cuidadosa, abstinencia sexual durante el periodo de cicatrización indicado.



Riesgos: Infección leve, leve incomodidad inicial.



Resultados: Movilidad total y natural del prepucio sin molestias, mejorando inmediatamente la calidad de vida sexual.

Matriz de Recuperación Urológica

Comparamos nuestras intervenciones para demostrar que la urología moderna se basa en procedimientos de rápida resolución y mínimo impacto sistémico.



El Protocolo Universal de Recuperación

Independientemente del procedimiento, el éxito a largo plazo se asegura siguiendo cuatro pilares de cuidado, acompañados siempre de nuestra supervisión médica.



1. Higiene y Cuidado Local

Mantener las zonas de incisión limpias y secas, utilizando solo los productos asépticos recomendados.



2. Reposo Estratégico

Respetar los tiempos de abstinencia sexual y evitar esfuerzos físicos pesados para garantizar una cicatrización sin tensión.



3. Medicación Puntual

Cumplimiento estricto del esquema de antibióticos profilácticos y analgésicos para una experiencia libre de dolor.



4. Seguimiento Continuo

Asistencia a las citas de revisión programadas con la Dra. Paola para confirmar la evolución clínica exitosa.

**Recuperación
Óptima**